



"il est passé par ici
et ne passera pas par là"

Eviter de partager des
objets de toilette
potentiellement blessants
(brosse à dents, rasoirs...)

me nous le savon
existe plusieurs
tes d'hépatites ...

Pratiques sexuelles à risques,
le port de préservatif est INDISPENSABLE

Utiliser du matériel à USAGE UNIQUE



Plaquette réalisée par :
Gwenael Bourreau
Michel Calicat
Elisabeth Goncalves
Asmahane Kerfa
Paulo Dias
Christophe Morin
Nasser Hamoudi
Illustration : Alexandre Luu

Hépatite

Cette plaquette a été réalisée au cours du stage "les étapes vers l'emploi" mis en place par Drogues et Société et Faire dans le cadre du Programme Départemental d'Insertion du Conseil Général du Val de Marne, du Programme EQUAL FSE avec le soutien de la Communauté d'Agglomération de la Plaine Centrale du Val de Marne, des villes de Créteil, Maisons Alfort, Bonneuil, et de la DDASS du Val de Marne.



En 1995,

le sida devenait la première cause de mortalité des personnes de moins de 35 ans.

30 000 personnes étaient mortes de cette maladie et chaque année 7000 personnes devenaient séropositives.

Trois millions de brochures d'information et prévention avaient été éditées et diffusées dans les différents comités régionaux.

En 2003,

le taux de mortalité par le virus du sida a diminué considérablement; les campagnes de prévention-information et la Journée Mondiale de Lutte Contre le Sida ont contribué à ce résultat, mais c'est surtout l'accès à des matériels stériles d'injection et l'accès aux traitements de substitution qui ont permis aux usagers de drogues de se protéger des risques de contamination.



Qu'est-ce que l'Hépatite C ?



L'Hépatite C est une hépatite virale, infection du foie par un virus. Parfois, la guérison est spontanée quelques semaines après l'infection par le virus, mais le plus souvent, 8 fois sur 10, le virus s'installe dans le foie et la maladie évolue pendant de nombreuses années.

La transmission du virus de l'Hépatite C se fait essentiellement par le sang, soit par contact direct entre le sang d'un sujet infecté et celui d'une personne non infectée, soit par le contact entre un objet souillé par le sang d'une personne infectée et le sang d'une personne non infectée.

L'usage de drogues par voie intraveineuse représente aujourd'hui le mode de contamination par le VHC le plus fréquent.

Sur 5000 nouvelles contaminations par an en France, plus de 70% sont liées à l'usage de drogues.

6 usagers de drogues par voie intraveineuse sur 10 ont une hépatite C chronique.

La consommation d'alcool est fortement déconseillée car elle entraîne une accélération de la maladie.

